

**Втори ден, 14 април 2019 г.**  
**Решения на задачите**

**Задача 4.** (П. Бойваленков, Е. Колев, С. Харизанов) Да се намерят всички естествени числа  $d$ , за които съществува естествено число  $k \geq 3$ , такова, че числата  $d, 2d, 3d, \dots, kd$  могат да се наредят в редица със следното свойство: сумата на всеки две съседни числа е точен квадрат.

**Решение.** *Отговор:* Всяко  $d$ , което е точен квадрат. Ясно е, че ако съществува  $k \geq 3$  и наредба на  $d, 2d, 3d, \dots, kd$ , то същото  $k$  и същата наредба ще работят за всяко  $d_1 = s^2d$ ,  $s \in \mathbb{N}$ . Следователно, достатъчно е да разглеждаме естествените числа  $d$ , свободни от квадрати. При  $d = 1$  имаме пример за  $k = 15$ :

$$8, 1, 15, 10, 6, 3, 13, 12, 4, 5, 11, 14, 2, 7, 9.$$

Нека сега  $d > 1$ . Независимо от наредбата на членовете на прогресията, сумата на всеки две съседни ще се дели на  $d$ , и тъй като  $d$  е свободно от квадрати, то необходимо условие да съществува  $k$  с исканото свойство е: всички генерирани точни квадрати да се делят на  $d^2$ . Задачата се трансформира до: да се наредят числата от 1 до  $k$  в редица  $a_1, a_2, \dots, a_k$  така, че за всяко  $i = 1, 2, \dots, k-1$  съществува естествено число  $q_i$  със свойството:  $a_i + a_{i+1} = dq_i^2$ . Но тогава

$$a_i + a_{i+1} \equiv 0 \pmod{d} \Rightarrow a_i \equiv -a_{i+1} \pmod{d} \Rightarrow a_{2j} \equiv a_{2\ell} \equiv -a_{2\ell+1} \equiv -a_{2j+1} \pmod{d}$$

и значи в цялата редица се срещат само два различни остатъка по модул  $d$ . Следователно  $k = 2$  (което е невъзможно) или  $d = 2$ . Последното означава, че числата  $a_1, a_2, \dots, a_k$  са от една и съща четност, което е невъзможно.

*Оценяване.* 1 т. за свеждане на задачата до свободни от квадрати  $d$ , 2 т. за пример при  $d = 1$  (или в общ вид), 1 т. за съображението, че всички генерирани точни квадрати се делят на  $d^2$ , 2 т. за достигане до само два остатъка и заключение при  $d > 2$ , 1 т. за случая  $d = 2$ .

**Задача 5.** (А. Иванов, С. Харизанов) В изпъкнал 2019-ъгълник са построени всички диагонали, като никои три от тях не се пресичат в една точка. Пресечна точка на два диагонала, вътрешна за многоъгълника, се нарича *възел*. Колко най-много възли могат да се оцветят, така че да не съществува цикъл с оцветени възли, всеки два последователни от които да са върху един и същи диагонал?

**Решение.** *Отговор:*  $\frac{2019(2019-3)}{2} - 1 = 2035151$ . Да разгледаме по-общата задача, където 2019 е заменено с  $n \geq 4$ . Ще докажем, че в изпъкнал  $n$ -ъгълник, на който никои три от диагоналите не се пресичат в една точка можем да оцветим най-много  $\frac{n(n-3)}{2} - 1$  от възлите, така, че да не съществува едноцветен цикъл.

Първо ще дадем оценка, че броят на оцветените възли е по-малък от  $\frac{n(n-3)}{2}$ . Да допуснем противното и да разгледаме граф, чийто върхове отговарят на диагоналите на  $n$ -ъгълника, а ребрата – на оцветените възли. Тъй като броят диагонали в изпъкнал  $n$ -ъгълник е точно  $\frac{n(n-3)}{2}$ , то в конструирания граф броят на ребрата е не по-малък от броя на върховете и значи съдържа цикъл. Но лесно се вижда, че има взаимно еднозначно съответствие между циклите в графа и едноцветните цикли с възли като върхове.

Сега ще покажем по индукция, че можем да оцветим  $\frac{n(n-3)}{2} - 1$  възела без да “зациклим”. Базата при  $n = 4$  е тривиална. Нека сега за произволен изпъкнал  $n$ -ъгълник сме доказали, че можем да оцветим  $\frac{n(n-3)}{2} - 1$  от възлите му без наличието на едноцветени цикъл. Да разгледаме изпъкнал  $(n+1)$ -ъгълник  $A_1A_2 \dots A_{n+1}$  и да вземем едно такова оцветяване за възлите на  $A_1A_2 \dots A_n$ . Добавяйки върха  $A_{n+1}$ , страната  $A_1A_n$  от  $A_1A_2 \dots A_n$  се трансформира в диагонал и към диагоналите на  $A_1A_2 \dots A_n$  добавяме и диагоналите  $A_{n+1}A_i$ ,  $i = 2, \dots, n-1$ . Сега върху  $A_1A_n$  имаме точно  $n-2$  възела, които оцветяваме. Освен това оцветяваме още един възел върху диагонал от  $A_{n+1}$ , например пресечната точка на  $A_{n+1}A_2$  и  $A_1A_3$ . (Поради изпъкналостта на фигурите е ясно, че всички гореизброени пресечни точки са наистина вътрешни за многоъгълника и значи са възли!) Общо получихме

$$\frac{n(n-3)}{2} - 1 + (n-1) = \frac{(n+1)(n-2)}{2} - 1$$

оцветени възела. Измежду новооцветените  $n-1$  възела “съседство” се реализира единствено върху диагоналите  $A_1A_n$  и  $A_2A_{n+1}$ . При това, всеки друг диагонал през  $A_{n+1}$  съдържа точно един оцветен възел, т.е., не реализира съседства. Лесно се съобразява, че за да съществува едноцветен цикъл, при положение,

че оцветяването на възлите на  $A_1A_2 \dots A_n$  е ациклично, в него трябва да участват поне два от новооцветените възли и значи поне един от възлите върху  $A_1A_n$ . Но, освен помежду си, тези възли общо имат точно един цветен съсед (по конструкция) и няма как да се образува цикъл с тяхно участие. Следователно конструираното оцветяване също е ациклично и индукцията е завършена.

*Оценяване.* 3 т. за оценката, 4 т. за конструкцията (2 т. за коректна конструкция с хипотеза, но без доказателство).

**Задача 6.** (А. Иванов, С. Герджиков) Даден е шестоъгълник  $ABCDEF$ , вписан в окръжност, за който

$$AB \cdot CD \cdot EF = BC \cdot DE \cdot AF.$$

Нека точките  $B$  и  $B_1$  са симетрични относно правата  $AC$ ,  $D$  и  $D_1$  са симетрични относно  $CE$ ,  $F$  и  $F_1$  са симетрични относно  $EA$ . Да се докаже, че  $\triangle B_1D_1F_1$  е подобен на  $\triangle BDF$ .

**Решение.** *Първи начин.* От условието  $|AB| \cdot |CD| \cdot |EF| = |BC| \cdot |DE| \cdot |AF|$  лесно се вижда, че  $AD$ ,  $BE$  и  $CF$  се пресичат в една точка. Това може да се види от триъгълник  $ACE$ , в който:

$$\frac{\sin \angle DAC}{\sin \angle DAE} = \frac{|DC|}{|DE|}, \quad \frac{\sin \angle AEB}{\sin \angle CEB} = \frac{|AB|}{|BC|} \quad \text{и} \quad \frac{\sin \angle ECF}{\sin \angle ACF} = \frac{|EF|}{|AF|}.$$

Като умножим трите равенства и използваме условието на задачата, получаваме  $\frac{\sin \angle DAC}{\sin \angle DAE} \frac{\sin \angle AEB}{\sin \angle CEB} \frac{\sin \angle ECF}{\sin \angle ACF} = 1$ . Оттук по синусовия вариант на Теоремата на Чева следва, че  $AD$ ,  $BE$  и  $CF$  се пресичат в една точка. Нека тази точка означим с  $P$ .

Сега да разгледаме  $\triangle AF_1P$  и  $\triangle CD_1P$ . Като използваме, че  $F_1$  и  $D_1$  са симетрични на  $F$  и  $D$  относно  $AE$  и  $CE$  и това, че шестоъгълникът е вписан, имаме, че:

$$\begin{aligned} \angle PAF_1 &= |\angle PAE - \angle F_1AE| = |\angle DAE - \angle FAE| \\ &= |\angle DCE - \angle FCE| = |\angle D_1CE - \angle PCE| \\ &= \angle PCD_1. \end{aligned}$$

Да обърнем внимание, че горното изразяване показва, че  $D_1$  и  $D$  са от различна страни на  $CF$  точно когато  $F$  и  $F_1$  са в една и съща полуравнина относно  $AD$ .

Освен това като използваме, че  $\triangle APF \sim \triangle CPD$  и  $|AF_1| = |AF|$  и  $|CD_1| = |CD|$  получаваме:

$$\frac{|AF_1|}{|CD_1|} = \frac{|AF|}{|CD|} = \frac{|AP|}{|CP|}$$

Следователно  $\triangle AF_1P \sim \triangle CD_1P$ . Оттук  $\angle APF_1 = \angle CPD_1$  и  $\frac{|F_1P|}{|D_1P|} = \frac{|AP|}{|CP|} = \frac{|FP|}{|DP|}$ , където последното равенство отново е от подобните  $\triangle APF \sim \triangle CPD$ . Освен това, тъй като  $D_1$  е извън  $\angle PCD$  точно когато  $F_1$  е в  $\angle FAP$ , то  $\angle F_1PD_1 = \angle APC = \angle FPD$ . С това имаме, че  $\frac{|F_1P|}{|D_1P|} = \frac{|FP|}{|DP|}$  и  $\angle F_1PD_1 = \angle FPD$ . Следователно,  $\triangle F_1D_1P \sim \triangle FDP$ . Това показва, че  $\frac{|F_1D_1|}{|FD|} = \frac{|F_1P|}{|FP|} = \frac{|D_1P|}{|DP|}$ . Аналогично се доказва, че  $\frac{|D_1B_1|}{|DB|} = \frac{|D_1P|}{|DP|} = \frac{|F_1D_1|}{|FD|}$  и  $\frac{|F_1B_1|}{|FB|} = \frac{|F_1P|}{|FP|} = \frac{|F_1D_1|}{|FD|}$ . Следователно  $\triangle F_1D_1B_1 \sim \triangle FDB$ .

*Втори начин.* Както по-горе виждаме, че диагоналите  $AD$ ,  $BE$  и  $CF$  се пресичат в една точка  $P$ .

Целта е да докажем, че  $|B_1D_1|/|BD| = |D_1F_1|/|DF| = |F_1B_1|/|FB|$ . За това първо ще изразим отношението  $|B_1D_1|^2/|BD|^2$ . Като че ли, най-удобно това става с косинусова теорема за триъгълниците  $BCD$  и  $B_1CD_1$ , защото  $|BC| = |B_1C|$  и  $|DC| = |D_1C|$ . Имаме следното:

$$\begin{aligned} |BD|^2 &= |BC|^2 - 2|BC||DC| \cos \angle BCD + |DC|^2 \\ |B_1D_1|^2 &= |B_1C|^2 - 2|B_1C||D_1C| \cos \angle B_1CD_1 + |D_1C|^2. \end{aligned}$$

Вадим от първото равенство второто и използваме равенството на отсечките  $|BC| = |B_1C|$  и  $|DC| = |D_1C|$ :

$$\begin{aligned} |BD|^2 - |B_1D_1|^2 &= 2|BC||DC|(\cos \angle B_1CD_1 - \cos \angle BCD) \\ &= 2|BC||DC|2 \sin \frac{\angle B_1CD_1 + \angle BCD}{2} \sin \frac{\angle BCD - \angle B_1CD_1}{2}, \end{aligned} \quad (1)$$

където използвахме основно тригонометрично тъждество.

Сега искаме да изразим  $\frac{\angle B_1CD_1 + \angle BCD}{2}$  и  $\frac{\angle BCD - \angle B_1CD_1}{2}$  чрез ъглите на шестоъгълника. Това обаче зависи от разположението на точките  $B$ ,  $D$ ,  $B_1$  и  $D_1$  около  $C$ . Възможни са два случая:  $B, B_1, D_1$  и  $D$  се срещат в този ред в по-малкия ъгъл  $\angle BCD$ , или  $B, D_1, B_1$  и  $D$  се срещат в този ред в по-малкия ъгъл  $\angle BCD$ . В първия случай:  $\angle BCD = \angle B_1CD_1 + \angle BCB_1 + \angle DCD_1$ , докато във втория:  $\angle BCD = -\angle B_1CD_1 + \angle BCB_1 + \angle DCD_1$ . Това показва, че  $\frac{\angle B_1CD_1 + \angle BCD}{2}$  се изразява както  $\frac{\angle B_1CD_1 - \angle BCD}{2}$  във втория случай и обратно. Това показва, че резултатът от изразяването на  $\sin \frac{\angle B_1CD_1 + \angle BCD}{2} \sin \frac{\angle BCD - \angle B_1CD_1}{2}$  няма да зависи от това, в кой от два случая се намираме. Поради това е достатъчно да разгледаме само първия случай.

Тогава  $\frac{\angle B_1CD_1 + \angle BCD}{2} = \angle ACD$ , докато за  $\frac{\angle BCD - \angle B_1CD_1}{2}$  имаме:

$$\begin{aligned} \frac{\angle BCD - \angle B_1CD_1}{2} &= \frac{\angle BCB_1 + \angle DCD_1}{2} = \angle BCA + \angle DCE \\ &= \angle BEA + \angle DAE = \angle PEA + \angle PAE \\ &= 180^\circ - \angle APE. \end{aligned}$$

Като заместим тези равенства в израза за  $|BD|^2 - |B_1D_1|^2$ , получаваме:

$$\begin{aligned} |BD|^2 - |B_1D_1|^2 &= 2|BC||DC|2 \sin \angle ACE \sin \angle APE \\ &= 4|BC||DC| \frac{|AE|}{2R} \frac{|AE|}{|AP|} \sin \angle AEP \\ &= 4|BC||DC| \frac{|AE|^2}{2R|AP|} \frac{|AB|}{2R}, \end{aligned} \quad (2)$$

където  $R$  е радиусът на описаната окръжност. Тук използвахме последователно синусови теореми за  $\triangle ACE$ ,  $\triangle APE$  и накрая за  $\triangle ABE$ . Като преобразуваме горния израз, така че да изразим  $|B_1D_1|^2/|BD|^2$  получаваме:

$$\frac{|B_1D_1|^2}{|BD|^2} = 1 - \frac{|AB||BC||CD|}{|AP|R^2} \frac{|AE|^2}{|BD|^2}.$$

От подобие на  $\triangle APE$  и  $\triangle BPD$  имаме  $\frac{|AE|}{|BD|} = \frac{|AP|}{|BP|} = \frac{|EP|}{|DP|}$ , откъдето  $\frac{|AE|^2}{|BD|^2} = \frac{|AP||EP|}{|BP||DP|}$ . След като заместим в израза за  $\frac{|B_1D_1|^2}{|BD|^2}$  получаваме:

$$\frac{|B_1D_1|^2}{|BD|^2} = 1 - \frac{|AB||BC||CD|}{|AP|R^2} \frac{|AP||EP|}{|BP||DP|} = 1 - \frac{|AB||BC||CD||EP|}{R^2|BP||DP|}. \quad (3)$$

Аналогично се доказва, (циклично през два върха в шестоъгълника), че:

$$\frac{|D_1F_1|^2}{|DF|^2} = 1 - \frac{|CD||DE||EF||AP|}{R^2|DP||FP|}.$$

Следователно, достатъчно е да докажем, че:

$$\frac{|AB||BC||CD||EP|}{R^2|BP||DP|} = \frac{|CD||DE||EF||AP|}{R^2|DP||FP|},$$

което, като съкратим на равните дължини на отсечки, е еквивалентно на:

$$\frac{|AB||BC||EP|}{|BP|} = \frac{|DE||EF||AP|}{|FP|}, \quad (4)$$

Сега  $\triangle ABP \sim \triangle EDP$ , откъдето  $\frac{|AB|}{|AP|} = \frac{|DE|}{|EP|}$ , или  $|AB||EP| = |DE||AP|$ . Това прави горното равенство еквивалентно на:

$$\frac{|BC|}{|BP|} = \frac{|EF|}{|FP|}. \quad (5)$$

Последното обаче е очевидно, защото  $\triangle BCP \sim \triangle FEP$ . С това  $\frac{|B_1D_1|}{|BD|} = \frac{|D_1F_1|}{|DF|}$ . Равенството  $\frac{|D_1F_1|}{|DF|} = \frac{|F_1B_1|}{|FB|}$  следва от съображения за аналогия, тоест циклична ротация на върховете. Следователно  $\triangle BDF \sim \triangle B_1D_1F_1$ .

Оценяване. (Първи начин) 1 т. за доказателство, че  $AD$ ,  $BE$  и  $CF$  се пресичат в една точка, 3 т. за подобие  $\triangle AF_1P \sim \triangle CD_1P$ , 2 т. за  $\angle F_1PD_1 = \angle FPD$  и 1 т. за подобие  $\triangle F_1D_1P \sim \triangle FDP$ ; (Втори начин) 1 т. за доказателство, че  $AD$ ,  $BE$  и  $CF$  се пресичат в една точка; 1 т. за (1); 2 т. за (2); 1 т. за (3); 1 т. – за  $\frac{|B_1D_1|}{|BD|} = \frac{|D_1F_1|}{|DF|}$  след достигане до това, че (4) е достатъчно за  $\frac{|D_1F_1|}{|DF|} = \frac{|F_1B_1|}{|FB|}$ ; 1 т. – за  $\frac{|B_1D_1|}{|BD|} = \frac{|D_1F_1|}{|DF|}$  след достигане до това, че 5 е достатъчно за  $\frac{|D_1F_1|}{|DF|} = \frac{|F_1B_1|}{|FB|}$ .